

Аналитическая справка диагностического исследования
по методике (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич)
«выявление суицидального риска»

Данное диагностическое исследование проводилось в ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище» с 24.09.2018 по 02.10.2018 года среди студентов первого и второго курса.

Цель: выявление признаков суицидального поведения

Форма проведения: групповое тестирование.

Студентам были зачитаны выражения, которые нужно было соотнести с соответствующими колонками в бланке для ответов и отметить выбранный вариант.

На основании полученных данных проведенной диагностики по выявлению суицидального риска целесообразно помнить, что наличие суицидального риска определяет результат, полученный в колонке «Добровольный уход из жизни», а результаты остальных показателей дают информацию о факторе, который способствует формированию суицидальных намерений. Анализ полученных результатов представлен в таблице (таблица № 1).

таблица № 1

Шкалы	Максимальное количество баллов по шкале	Набранное количество баллов по шкале
Алкоголь, наркотики	Юноши–11; девушки–9	Юноши–9; девушки–6
Несчастливая любовь	Юноши–11; девушки–10	Юноши–7; девушки–9
Противоправные действия	Юноши–15; девушки–15	Юноши–11; девушки–8
Деньги и проблемы с ними	Юноши–20; девушки–20	Юноши–18; девушки–14
Добровольный уход из жизни	Юноши–8; девушки–8	Юноши–8; девушки–8
Семейные неурядицы	Юноши–13; девушки–13	Юноши–5; девушки–7
Потеря смысла жизни	Юноши–12; девушки–13	Юноши–8; девушки–10

Чувство неполноценности, ущербности, уродливости	Юноши–13; девушки–13	Юноши-4; девушки–11
Учебные проблемы, проблемы выбора жизненного пути	Юноши–12; девушки–13	Юноши-4; девушки–5
Отношения с окружающими	Юноши–23; девушки–25	Юноши-19; девушки–21

Если результат колонки «Добровольный уход из жизни» меньше представленных в интерпретационной таблице показателей, то это означает, что фактор суицидального риска отсутствует, но при этом можно судить о других факторах, представленных в остальных колонках, как о стрессогенных проблемах, влияющих на состояние психологического комфорта подростка. Обобщая полученную информацию по данной методике, можно сделать вывод, что показатели всех шкал находятся в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии суицидального риска среди студентов.

Анализируя полученные данные по диагностическому исследованию социально-психологической службой училища, провести в 2018-2019 учебном году следующие профилактические мероприятия:

- Классный час «Мы выбираем жизнь»;
- тренинг «Все в жизни можно исправить, пока ты жив»;
- тренинг «Дорога жизни».

Педагог-психолог

Е.Е. Маркеева